

## YaraVita Bór

### HNOJIVO ES

Typ hnojiva: Boretanolamin

Používat jen v případě skutečné potřeby.  
Nepřekračujte doporučené dávky.

Deklarovaný obsah:

Bór (B) 10,9 % = 150 g/l Bóru (B), vodorozpustný

Balení: 10 l

Čistá hmotnost: 13,75 kg

Distributor: YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN

### APLIKACE:

**Řepka:** 2 l/ha na podzim ve stádiu 4 listů. Na jaře 2 l/ha na začátku dlouhivého růstu.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Cukrovka:** 2 - 3 l/ha ve stádiu 4 - 6 listů. Při silném nedostatku opakovat po 10 - 15 dnech.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Brukvovitě:** 3 l/ha ve stádiu 4 - 6 listů, při zjištěném silném nedostatku opakovat po 10 - 15 dnech.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Mák:** 1 l/ha ve stádiu 6- 8 listů

Dávka vody: 200 l/ha.

**Brambory:** 1 l/ha týden po zapojení řádků.B26

Dávka vody: 200 l/ha.

**Jabloně:** 1 l/ha ve stádiu růžového poupěte do začátku kvetení, druhá aplikace po opadu okvětních lístků.  
2l ha po sklizni před opadem listů.

Dávka vody: 500 - 1000l/ha.

**Jahody:** Dvě aplikace po 1 l/ha, první ve stádiu bílého poupěte, druhá o 14 dní později.

Dávka vody: 200 - 500l/ha.

**Třešně:** 1 l/ha ve stádiu růžového poupěte.

2l/ha po sklizni před opadem listů.

Dávka vody: 500 - 1000l/ha.

**Vinná réva:** 3 l/ha při otevírání pupenů, 3 l/ha před kvetením.

Dávka vody: 200 - 500l/ha.

**Mrkev, karotka:** 2-3 l/ha při výšce porostu 10 - 15 cm. Při silném nedostatku opakovat po 10 - 15 dnech.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Cibule:** 1- 2 l/ha ihned po dosažení dostatečné listové plochy. Při nedostatku opakovat po 10 - 15 dnech.

Dávka vody: 200 l/ha.