









Program fertigace jabloní

(doporučení se vztahuje k výsadbě jabloní o hustotě cca 2 500 stromů / ha, pozdnější odrůdy na podnoži Mg)

Fáze		YaraLiva™	KRISTALON
1. týden po plném kvetení			Žlutý 25 kg
2. týden po plném kvetení		Calcinit 10 kg	Žlutý 15 kg
3. týden po plném kvetení		Calcinit 15 kg	Žlutý 15 kg
4. týden po plném kvetení		Calcinit 30 kg	
5. týden po plném kvetení		Calcinit 15 kg	Modrý 25 kg
6. týden po plném kvetení		Calcinit 15 kg	Modrý 25 kg
7. týden po plném kvetení		Calcinit 15 kg	Modrý 25 kg
8. týden po plném kvetení		Calcinit 15 kg	Modrý 25 kg
9. týden po plném kvetení			Bílý 25 kg
10. týden po plném kvetení			Bílý 25 kg
11. týden po plném kvetení			Bílý 20 kg
12. týden po plném kvetení			Bílý 15 kg
13. týden po plném kvetení			Bílý 10 kg
14. týden po plném kvetení			Bílý 10 kg

- Všechna hnojiva míchat v koncentraci 0,05–0,3 % (0,5–3 kg na 1 000 l vody)
- NIKDY nemíchat YaraLiva Calcinit a Kristalony v jedné nádrži.
- Velmi důležitým doplňkem fertigace je pro komplexní a vyrovnanou výživu jabloní současné používání listových hnojiv z programu firmy Yara.

Hnojiva YARA pro výživu jabloní

YaraMila™ COMPLEX

12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

YaraLiva™ NITRABOR

Prilovaný ledek vápenatý 15,5%N s obsahem boru pro lepší příjem vápníku

YaraLiva™ CALCINIT

100% vodorozpustný ledek vápenatý do všech závlahových systémů a všech druhů postřiků

YaraVita™ FRUTREL

Speciální formulované kapalné hnojivo s dusíkem, fosforem, vápníkem, hořčíkem, bórem a zinkem do ovoce a vinné révy

YaraVita™ BORTRAC 150

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací

YaraVita™ ZINTRAC 700

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění nedostatku zinku listovou aplikací

YaraVita™ STOPIT

Koncentrované kapalné formulované vápenaté hnojivo k aplikaci na list pro jádrové ovoce a jiné plodiny

YaraVita™ SENIPHOS

Koncentrované kapalné formulované fosforečné hnojivo s vápníkem pro zlepšení kvality plodů a redukci fyziologických chorob při skladování

YaraVita™ MANTRAC PRO

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění nedostatku manganu listovou aplikací

KRISTALON™ ŽLUTÝ 13+40+13 + MIKROPRVKY

KRISTALON™ MODRÝ 19+6+20 + MIKROPRVKY

KRISTALON™ BÍLÝ 15+5+30 + MIKROPRVKY

Všechny informace uvedené v letáku mají charakter doporučení, jejich využitím nevznikají žádné právní nároky vůči společnosti YARA.



Knowledge grows

Výživa jabloní

Komplexní program



Základní a listová výživa jabloní

Knowledge grows



Růstová fáze

Rašení pupemů

Růžové poupě

Opad okvětních lístků

Násada plodů

Plody o velikosti vlašského ořechu

Růst plodů

Po sklizni

YaraMila™

COMPLEX
200 kg/ha

■ Aplikace na půdu

■ Aplikace na list

YaraLiva™

NITRABOR
200 kg/ha

YaraVita™

BORTRAC *
1 l/ha

FRUTREL ***
5 l/ha

STOPIT ****
5–10 l/ha

BORTRAC
1 l/ha

YaraVita™

ZINTRAC **
0,5 l/ha

MANTRAC
6× 0,25 l/ha

ZINTRAC
0,5 l/ha

YaraVita™

SENIPHOS
3× 5–7 l/ha

Poznámky:

* 1–1,5 l/ha - 1. ošetření během otevírání pupenů, 2. a 3. ošetření po 15 dnech

** 1–2 l/ha - při rašení a na konci kvetení, 0,5 l/ha - 6 týdnů po nasazení a opak. dle potřeby po 14–21 denních intervalech do 30 dnů před sklizní, 0,5–1 l/ha - po sklizni před opadem listů

*** 5–10 l/ha - v době rašení pupenů. Opakovaná aplikace po opadu okvětních lístků a ve fázi násady plodů v 10–14 denních intervalech

**** 5–10 l/ha v 10–14 denních intervalech během růstu plodu, ukončit max. 14 dní před sklizní

Specifické dávky se mohou lišit podle regionů, klimatických a půdních podmínek a musí být podle toho upraveny. Vždy čtěte etiketu před použitím.