




## Program fertigace cibule

Fáze		KRISTALON	YaraLiva
20–50. den každý 8. den (celkově 100 kg hnojiva/ha)		<b>ŽLUTÝ</b> 4×25 kg/ha během této fáze	
51–80. den každý 8. den (celkově 100 kg hnojiva/ha)		<b>MODRÝ</b> 4×25 kg/ha během této fáze	
81–130. den každý 3. den (celkově 200–210 kg/ha KRISTALON  (celkově 300 kg/ha CALCINIT)		<b>BÍLÝ</b> 8×25 kg/ha během této fáze střídavě s YaraLiva CALCINIT	<b>CALCINIT</b> 8×36 kg/ha během této fáze střídavě s KRISTALON BÍLÝ

## Hnojiva YARA pro výživu cibule

### YaraMila™ COMPLEX

12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

### Unika™ CALCIUM

14,2% N+24% K<sub>2</sub>O+12% CaO  
Vysoce kvalitní a dobře rozmetatelné granulované NK hnojivo s vápníkem

### YaraLiva™ CALCINIT

100% vodorozpustný ledek vápenatý do všech závlahových systémů a všech druhů postřiků

### YaraVita™ MANTRAC PRO

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro odstranění nedostatku manganu listovou aplikací

### YaraVita™ ZINTRAC 700

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro odstranění nedostatku zinku listovou aplikací

### YaraVita™ COPTRAC 500

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro odstranění nedostatku mědi listovou aplikací

### YaraVita™ BORTRAC 150

Koncentrované formulované hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací

### YaraVita™ KOMBIPHOS

Koncentrované kapalně formulované hnojivo obsahující fosfor, draslík, hořčík, mangan a zinek. Pohotová energie v případě nevyrovnaných porostů u celé škály plodin

**KRISTALON™ ŽLUTÝ** 13+40+13+MIKROPRVKY

**KRISTALON™ MODRÝ** 19+6+20+MIKROPRVKY

**KRISTALON™ BÍLÝ** 15+5+30+MIKROPRVKY

Všechny informace uvedené v letáku mají charakter doporučení, jejich využitím nevznikají žádné právní nároky vůči společnosti YARA.



Knowledge grows

# Výživa cibule

Komplexní program

\* Zásobní roztok by měl mít koncentraci od 0,05–0,3 % (0,5–3 kg hnojiva na 1000 l vody). Všechna doporučená hnojiva se mohou míchat dohromady v mateřském roztoku a vstříknuta do závlahové vody. Doporučujeme rozdělit aplikaci a dávku po týdenních cyklech.

Doporučené dávky jsou orientační a musí být přizpůsobeny místním podmínkám.



Knowledge grows

# Základní a listová výživa cibule



Růstová fáze

Předseťově

Po vzejití

Období intenzivního růstu (3–9 listků - počátek tvorby cibulí)  
Stádium 4–6 listků

**YaraMila™**

**COMPLEX**  
100–150 kg/ha

■ Aplikace na půdu  
■ Aplikace na list

**Unika™**

**CALCIUM \***  
2× 150–200 kg/ha

**YaraVita™**

**KOMBIPHOS \*\***  
5 l/ha

**YaraVita™**

**ZINTRAC**  
0,5 l/ha  
**MANTRAC**  
0,5 l/ha

**YaraVita™**

**COPTRAC**  
0,5 l/ha  
**BORTRAC**  
2 l/ha

podzim

jaro

Poznámky:

\* 2–3 týdny po vzejití až do začátku června

\*\* V případě stresu nebo potřeby během vegetace i z aplikace na list