




# Program výživy Rané brambory



Růstová fáze

0  
Před sázením

9–19  
Po vzejití

20–34  
Prodlužovací

35–39  
Začátek nasazování hlíz

49  
Nasazování hlíz

61–65  
Kvetení

**YaraMila™**

**COMPLEX \*\*\***  
+ MgO + S  
+ mikroprvky  
400 kg/ha

**YaraVera™**

**UREAS \***  
38 % N + 7 % S  
100 kg/ha

**YaraBela™**

**EXTRAN 27**  
200 kg/ha

**YaraVita™**

**KOMBIPHOS \***  
(P, K, Mg, Mn a Zn)  
5 l/ha

**KOMBIPHOS \*\***  
(P, K, Mg, Mn a Zn)  
5 l/ha

**MANTRAC**  
(500 g Mn)  
0,5 l/ha

**YaraVita™**

**BORTRAC**  
(150 g B)  
1 l/ha

**BORTRAC**  
(150 g B)  
1 l/ha

**THIOTRAC**  
(300 g S, 200 g N)  
3 l/ha

**YaraTera™**

**KRISTA-K Plus**  
(46 % K<sub>2</sub>O, 13,5 % NO<sub>3</sub>)  
5 kg/ha

**MAGNITRA**

s pesticidem **MAGNITRA**  
2 aplikace  
(13,5 % MgO, 9,5 % NO<sub>3</sub>)  
6 l/ha 6 l/ha

■ Aplikace na půdu  
■ Aplikace na list

Předpokládaný výnos  
40 tha.

\* tato aplikace v době  
háčkování podporuje  
nasazování hlíz, u raných  
brambor pro první sklizeň  
tuto aplikaci vynechat

\*\* aplikovat při velikosti  
hlíz cca 10 mm,  
u raných brambor  
zvýšit dávku na 10 l/ha.  
Tato aplikace podporuje  
rychlý vyrovnaný růst  
hlíz do požadované tržní  
velikosti

\*\*\* bezchloridové NPK  
pro plodiny citlivé  
na chlor