




Program fertigace malin

Fáze		YaraLiva	KRISTALON
Počátek vegetace od 1.5. do 14.6. (okolo 6–7 týdnů)		CALCINIT 8 kg/ha	MODRÝ 12 kg/ha
Od květu až do sběru od 15. 6. do 30. 7. (okolo 6–7 týdnů)		CALCINIT 15 kg/ha	ČERVENÝ 25 kg/ha
Po sběru od 1.8. cca 4 týdny		CALCINIT 15 kg/ha	ČERVENÝ 7 kg/ha

Doporučené dávky na týden

- Všechna hnojiva míchat v koncentraci 0,05–0,3 % 0,5–3 kg na 1 000 l vody
- Na půdách s vysokým pH doporučujeme použít Kristalon Vega namísto Kristalonu modrého a Kristalon Red Acid namísto Kristalonu červeného
- **NIKDY nemíchat YaraLiva Calcinit a Kristalony v jedné nádrži**
- Velmi důležitým doplňkem fertigace pro komplexní a vyrovnanou výživu malin je současné použití základního půdního hnojiva YaraMila Complex a listových hnojiv z řady YaraVita

Hnojiva YARA pro výživu malin

YaraMila™ COMPLEX

12+11+18+3MgO+2S - priložené bezchloridové NPK hnojivo s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

Unika™ CALCIUM

14,2% N+24% K₂O+12% CaO
Vysoce kvalitní a dobře rozmetatelné granulované NK hnojivo s vápníkem

YaraVita™ BORTRAC 150

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací

YaraVita™ ZINTRAC 700

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění nedostatku zinku listovou aplikací

YaraLiva™ CALCINIT

100% vodorozpustný ledek vápenatý do všech závlahových systémů a všech druhů postřiků

KRISTALON™ MODRÝ 19+6+20+MIKROPRVKY

KRISTALON™ VEGA 17+6+25+MIKROPRVKY

KRISTALON™ ČERVENÝ 12+12+36+MIKROPRVKY

KRISTALON™ RED ACID 11+11+32+MIKROPRVKY

KRISTALON™ ORANŽOVÝ 6+12+36+MIKROPRVKY

KRISTALON™ SPECIÁL 18+18+18+MIKROPRVKY



Knowledge grows

Výživa malin

Komplexní program

Všechny informace uvedené v letáku mají charakter doporučení, jejich využitím nevznikají žádné právní nároky vůči společnosti YARA.



Základní a listová výživa malin

Knowledge grows



Růstová fáze

Počátek
vegetace

Začátek
kvetení

Růst
plodů

Dozrávání
plodů

Sběr
plodů

Po sklizni

YaraMila™

COMPLEX
200 kg/ha

■ Aplikace na půdu

■ Aplikace na list

Unika™

CALCIUM
250 kg/ha

YaraLiva™

CALCINIT
5 kg/ha každých 5-7 dní

YaraVita™

ORANŽOVÝ
3 kg/ha každých 5-7 dní střídavě s CALCINITEM

BORTRAC
2 l/ha
ZINTRAC
1 l/ha

KRISTALON™

SPECIÁL
3 kg/ha
7 dní po sběru

Poznámky:

Specifické dávky se mohou lišit podle regionů, klimatických a půdních podmínek a musí být podle toho upraveny. Vždy čtěte etiketu před použitím.